

Egne notater:



Information om brandsår efter behandling på skadestue



Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

Afsnit 3004
Opgang 3, stuen
HovedOrtoCentret
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Telefon: 3545 3801

Mandag-fredag kl. 8:30-14:00
Uden for dette tidsrum kan du ringe til sygeplejerskerne i
sengeafsnittet på telefon: 3545 2104

Web: www.plastikkirurgi-brandsaar.rh.dk

@: plastikir-brandsaar@rh.hosp.dk

Rigshospitalet er røgfrit område.

Revideret marts 2007 af:

Sygeplejerske Birgit Søjberg og udviklingssygeplejerske Alexandra Iuel.
Godkendt af overlæge Bjarne Alsbjørn.

**Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling
HovedOrtoCentret**

I denne pjeces vil vi gerne informere dig om, hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med dine brandsår og den fortsatte behandling.

Formålet med behandlingen

Brandsår væsker ofte meget de første døgn. Derfor har du fået pakket dit brandsår ind med en tyk forbindelse, som kan suge væsken fra brandsåret.

For at give såret bedst mulig betingelse for at hele, er det vigtigt, at forbindingen først bliver skiftet 10 - 12 dage efter brandskaden er sket.

Såfremt såret er helet, skal der ikke ske yderligere, men hvis det ikke er helet, skal det vurderes af en læge m.h.p videre behandling.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Det er normalt, at der kommer en hævelse i området på huden, hvor der er en forbrænding. For at mindske hævelsen kan du gøre følgende:

- Ved forbrændinger i ansigtet skal du løfte hovedgærdet eller bruge en ekstra pude, når du sover.
- Ved forbrændinger på underarme, skal du holde armen over hjertehøjde.
- Ved forbrændinger på underben og fødder, skal benet så vidt muligt holdes i ro. Benet skal være løftet op på en stol, når du sidder ned.
- Ved håndforbrændinger, se pjecen "Information om håndforbrændinger".
- Solens stråler øger risikoen for solskoldning og efterlader i nogle tilfælde en mørkfarvning af huden, som ikke forsvinder igen. Huden skal derfor beskyttes så længe den er rød, hvilket den kan være i ½-1 år.

I hvilke tilfælde skal jeg søge lægehjælp?

- Hvis forbindingen forskubber sig.
- Hvis der siver væske fra brandsåret gennem

forbindingen. Ganske små gennemsivninger har ingen betydning, men hvis forbindingen virker våd, skal den skiftes.

- Hvis du ved et uheld kommer til at gøre forbindingen meget våd.
- Hvis forbindingen begynder at lugte.
- Hvis du får feber.

Hvor skal jeg komme til ambulans kontrol eller henvende mig, hvis der opstår problemer?

Egen læge

Eget hospital: _____
Afdeling: _____
Henvendelse på tlf: _____
Hverdage mellem kl. _____

Rigshospitalet, Ambulatoriet for
Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling
afsnit 3004, opgang 3 i stuen.

Ring venligst og bestil tid på telefon: 3545 2609,
hverdage mellem kl. 9.00-11.00 eller kl.13.00- 15.00

Medbring altid skadesedlen fra skadestuen, når du henvender dig til din egen læge, det lokale hospital eller Rigshospitalet.