

Bronkoskopi



UNDERSØGELSE • OPERATION • BEHANDLING • SYGEPLEJE

Rigshospitalets Hjertecenter

Thoraxkirurgisk klinik RT

Undersøgelse af luftrøret og bronkierne

Denne informationspjece er til dig, der skal have foretaget en bronkoskopi.

Ved bronkoskopi føres en kikkert ned gennem luftrøret og ud i lungerne på højre og venstre side. Herved kan man se eventuelle forandringer og tage prøver til undersøgelse under mikroskop. Der kan tages prøver både af slimhinden i bronkierne og af lungevævet. Desuden kan man i visse tilfælde brænde unormalt væv bort.

Undersøgelsen foregår i fuld bedøvelse.

Før undersøgelsen

Du indlægges dagen før undersøgelsen for at få optaget journal og taget blodprøver. Du skal tale med en sygeplejerske, den læge som skal operere dig, og narkoselægen. Der kan blive nogen ventetid mellem disse samtaler.

Hvis du ønsker det, er du velkommen til at overnatte hjemme inden operationen og møde i afdelingen næste morgen kl. 06.30. Du må spise til kl. 02.00 natten før operationen og drikke til kl. 06.00 - dog ikke drikkevarer, der indeholder mælkeprodukter. Vi anbefaler, at du drikker to glas saft kl. 06.00, så du har et normalt blodsukker under operationen.

Har du været indlagt til bronkoskopi før, er det muligvis aftalt, at du møder fastende samme dag, som undersøgelsen foretages. Så vil det typisk ikke være nødvendigt med nye blodprøver, ligesom der kun vil blive optaget et kort journalnotat inden undersøgelsen.



Ubehag og komplikationer

Ømhed i halsen er almindeligt i op til et par dage efter undersøgelsen. Det er også normalt, at du hoster en del efter bronkoskopien - måske i form af opspyt iblandet blod. Hvis du har behov for det, bliver du tilbudt smertestillende medicin - f.eks. *Panodil*, som også fås i håndkøb.

I sjældne tilfælde kan der gå hul på lungen, når der tages en prøve af lungevævet, og det bliver i så fald nødvendigt at lægge dræn (en plastikslange) i siden af brystkassen, så lungen kan folde ud og blive tæt igen. Anlæggelse af dræn sker i lokalbedøvelse.

Svar på undersøgelsen

Har du fået taget en prøve fra lungen, kan der gå 4-5 dage, før svaret på den mikroskopiske undersøgelse foreligger. Du får ved udskrivelsen udleveret en ambulant tid til svaret. Med mindre andet er aftalt mellem dig og lægen, foregår det i ambulatoriet, afsnit 8523.

Pensionister har ret til kørsel til og fra vores ambulatorium. Er kørslen ikke arrangeret i forbindelse med bestilling af den ambulante tid, kan du ringe til sekretæren (se telefonnummer på ambulatoriekortet).

Hvis du bliver kørt af pårørende i egen bil, og afstanden er mere end 50 km, kan du i ambulatoriet bede om en skriftlig bekræftelse på, at du har været i her, hvorefter en kørselstakst kan refunderes på din kommunes kørselskontor.

Udskrivelse samme dag, som du har været bedøvet


De midler, der anvendes til bedøvelse i dag, udskilles hurtigt fra kroppen, og det er derfor i mange tilfælde muligt at blive udskrevet til eget hjem samme dag, et indgreb har været foretaget i fuld bedøvelse.

Har du været i fuld bedøvelse samme dag, som du bliver udskrevet, skal du være opmærksom på følgende:

- ♦ Du skal ledsages af en voksen/myndig person ved hjemtransport
- ♦ Der bør være en voksen person/myndig til stede i hjemmet til næste dag
- ♦ Du må ikke føre bil eller færdes alene i trafikken indtil 24 timer efter fuld bedøvelse
- ♦ Det frarådes, at du drikker alkohol indtil 24 timer efter fuld bedøvelse
- ♦ Opstår der problemer i relation til indgrebet indenfor 24 timer efter udskrivelsen, skal du henvende dig på telefon 3545 3151
- ♦ Opstår der problemer efter 24 timer, skal du henvende dig til din egen læge, vagtlægen eller den nærmeste skadestue







RIGSHOSPITALET
HJERTECENTER

Blegdamsvej 9
2100 København Ø



Oktober 2011, version nr. 3



Rigshospitalet