

Hørescreening

- af dit nyfødte barn

Høreundersøgelsen foregår på følgende måde.

Hvis I er indlagt på Rigshospitalet efter fødslen:

Personalet, der laver undersøgelsen vil så vidt muligt opsøge jer på den afdeling, hvor I er indlagt og aftale en tid med jer.

Hvis I ikke har fået lavet høreundersøgelsen

Inden I tager hjem fra hospitalet, skal I selv sørge for at ringe og få en tid til undersøgelsen på nedenstående numre.

Har du født ambulantly eller barslet på Barselhotellet i Aldersrogade:

Ring til Barselambulatoriet, Aldersrogade 6C og aftal tid på tlf. nr: **24 43 02 72**

Har du været indlagt eller barslet på en af Rigshospitalets afdelinger:

- Ring til Hørescreeningsygeplejersken og aftal tid og sted på: **35 45 07 59 (7.30 - 15.00)**

Børn, der har været på en **neonatalafdeling** i mere end 48 timer, tilbydes en udvidet undersøgelse.

Ring til hørescreeningsygeplejersken og aftal tid på tlf.: **35 45 07 59 (7.30 - 15.00)**.

NB! Husk at oplyse barnets cpr.-nr., når du bestiller tid.

Min aftale: Dato:____ Kl.:_____ Sted:_____

Om denne pjece

Udarbejdet af:
Hørescreeningsygeplejerske
Malene Wisborg
og kommunikationsrådgiver
Linda Svenstrup Munk.

Senest revideret 2011.

Obstetrisk Klinik
Rigshospitalet
Juliane Marie Centret
Blegdamsvej 3
2100 København Ø
www.gravid.rh.dk

REGION



Den første høreundersøgelse

Alle forældre får tilbudt en høreundersøgelse af deres nyfødte barn.

Høreundersøgelsen kan tages fra barnet er 2 døg gammelt og helst inden 14 dage/en måned

Høreundersøgelsen varer kun få øjeblikke. Den bliver taget, mens barnet sover. Det er ikke ubehageligt for barnet, og du er til stede hele tiden og får svar med det samme.

Hvorfor skal barnets hørelse undersøges?

Et til to børn ud af 1000 bliver født med en hørenedsættelse. I de fleste tilfælde uden, at der ellers er hørenedsættelse i familien.

Små børn reagerer på ting, som voksne ikke altid er bevidste om. Det er svært at vide, om barnet reagerer på lyd eller måske på ændringer i lys og lufttryk. Derfor er det svært som forældre at konstatere, om et spædbarn har en hørenedsættelse eller ej.

For at give barnet de bedste muligheder for en normal udvikling er det vigtigt, at en hørenedsættelse bliver opdaget så tidligt som muligt - og helst før barnet er 3 mdr. Jo før, desto bedre.

Barnet hører omverdenens lyde, udvikler sit sprog og sin evne til at kommunikere ved hjælp af høresan-

sen. Hørelsen bruges til at orientere sig med, opfange faresignaler med og til at kunne begå sig i sociale sammenhænge.

Hørelsen er på den måde med til at forme barnets psyke, personlighed og adfærd.

Hvordan udføres høreundersøgelsen?

Høreundersøgelsen bliver udført af personalet på Obstetrisk Klinik, og der bliver lavet en OAE-test, som evt. suppleres af en AABR-test.

• **OAE-testen (OtoAkustiskEmissions-måling):** Ved denne test sender en lille høretelefon kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, laver øret et ekko, som høretelefonen opfanger. Et ekko er et udtryk for, at øret er velfungerende, og at barnet kan høre.

• **AABR-testen (Automatisk Auditory Brainstem Respons-måling)** Ved denne test får barnet sat tre følere på hovedet og en høretelefon i øret. Høretelefonen sender en serie kliklyde ind i øret. Følerne måler hjernens reaktion på lyd.



Barnet skal sove

Når barnet skal undersøges, skal det helst sove.

Måleren registrerer et svar

Hvis der registreres et svar på den lyd, der sendes ind i øret, fungerer øret.

Dit barn hører derfor med al sandsynlighed normalt.

Alligevel er det vigtigt, at du også fremover er opmærksom på, om dit barn hører godt.

Bliver du bekymret over dit barns hørelse, skal du tale med din sundhedsplejerske eller læge. Dine overvejelser som forælder vil altid blive taget alvorligt.

Selv om måleren ikke registrerer et svar, er der i de fleste tilfælde ingen grund til bekymring. Oftest skyldes det baggrundsstøj, uro eller måleusikkerhed. Desuden kan barnet have fosterfedt i øregangen, hvilket er meget normalt hos nyfødte. Fosterfedtet forsvinder af sig selv.

Hvis måleren ikke viser et svar

Hvis målingerne ikke registrerer svar på et eller begge ører, får du en ny tid til en høreundersøgelse af dit barn. Dette sker for op til 10 % af alle børn og betyder ikke nødvendigvis, at dit barn har en hørenedsættelse.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de praktiske forhold i forbindelse med høreundersøgelsen, eller hvis du bliver forhindret i at møde op til undersøgelsen, skal du kontakte den afdeling, du har barslet på. Se telefonnumre på bagsiden.

Det er bedst at undersøge barnets hørelse, når det sover. Undersøgelsen er ganske kort og gør ikke ondt på barnet. Du er med hele tiden og får svar med det samme. Se information om tid og sted på bagsiden.



Denne pjeces er lavet ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger.