

Hvis der opstår problemer

Inden for de første 2 uger kan du kontakte sygeplejerskerne på afsnit 5031 på tlf. 3545 5031, hvis du får:

- kraftig blødning fra skeden
- tiltagende smerter
- feber.

Er der gået mere end 2 uger efter undersøgelsen, skal du kontakte din egen læge, hvis der er problemer.

Venlig hilsen

Personalet
Gynækologisk Klinik

Noter

Rev. juni 2010 af pjecegruppen i Gynækologisk Klinik



Rigshospitalet

Gynækologisk Klinik

Afsnit 5031
Opgang 5, 3. sal
Rigshospitalet
Juliane Marie Centret
Blegdamsvej 9,
2100 Kbh Ø

Telefon: 3545 5031

Email: gynaekologi@rh.dk

Web: www.gyn.rh.dk

**Rigshospitalet
Juliane Marie Centret
Gynækologisk Klinik**

REGION

Information om udvidet
gynækologisk undersøgelse


Velkommen i Gynækologisk Klinik

Når man bliver syg, vil de undersøgelser, der skal foretages, ofte give anledning til mange tanker, følelser og spørgsmål. Med denne folder vil vi forsøge at besvare nogle af de generelle spørgsmål, som mange i din situation har inden denne undersøgelse. Afdelingens personale vil naturligvis også tale med dig og svare på dine spørgsmål.

Selve undersøgelsen

For at kunne undersøge dig grundigt, skal du have foretaget en gynækologisk undersøgelse i fuld bedøvelse. To læger (en gynækolog og en onkolog) undersøger din skede, livmoderhals, blære og endetarm for at sikre, at sygdommen ikke har bredt sig. Undersøgelsen af blæren kaldes cystoskopi og udføres med en meget tynd kikkert, som føres op gennem urinrøret.

I nogle tilfælde tages også vævsprøver (biopsi). Vævsprøverne er med til at klarlægge, om sygdommen har bredt sig. Når undersøgelsen er overstået, vurderer lægerne, hvilken behandling du skal have tilbudt.



Efter undersøgelsen

Umiddelbart efter undersøgelsen bliver du kørt op i afdelingen. Du vil sandsynligvis være træt et par timer efter. Du vil oftest have et drop i hånden, der giver dig væske, indtil du føler dig frisk igen og begynder at drikke og spise.

Information om muligheder for behandling

En af de læger, som har foretaget undersøgelsen, vil sammen med en sygeplejerske informere dig om resultatet af undersøgelsen og dine muligheder for behandling.

Det er altid godt at have pårørende med som støtte ved denne samtale, så I er flere til at høre, hvad der bliver sagt.

Du vil kunne udskrives nogle timer efter undersøgelsen, men da du har været i fuld bedøvelse, vil vi råde dig til ikke at være alene det første døgn.

Komplikationer

De fleste oplever ingen smerter efter undersøgelsen, men har du brug for smertestillende medicin, må du endelig sige til.

Vi anbefaler, at du ved behov tager smertestillende tabletter: 1 gram Paracetamol, fx Panodil (tablet) 1-4 gange dagligt.

Efter undersøgelsen vil du kunne føle svie og ubehag ved vandladning. Dette skyldes irritation af urinrøret efter undersøgelsen og er forbigående. Fortsætter generne, skal du kontakte din praktiserende læge.

Der kan være blødning fra skeden 1-2 uger efter undersøgelsen på grund af de vævsprøver, der er taget.

Efter udskrivelsen

Allerede dagen efter undersøgelsen må du genoptage dine normale aktiviteter såsom at gå på arbejde og dyrke motion.

Hvis du har fået taget en vævsprøve, er der et sår i skeden, som heler efter 1-2 uger. Du og din partner kan genoptage samlivet på dette tidspunkt.

Du må ikke bruge tampon, så længe du bløder. I stedet anbefaler vi dig at bruge hygiejnebind.

Psykisk reaktion

De fleste bliver forskrækkede og bange, når de får at vide, at der er mistanke om en alvorlig sygdom. Mange kan opleve humørsvingninger og koncentrationsbesvær og får behov for omsorg og støtte. Brug derfor gerne personalet, familie og venner og involver dem i dine tanker og bekymringer.