

BEHANDLING AF SMERTER EFTER OPERATIONEN

Alle børn, der har gennemgået en operation skal have en smertebehandling. Smertebehandlingen er forskellig alt efter operationens type og omfang.

Ved mindre operationer vil Panodil enten i form af piller eller stikpiller være tilstrækkeligt. Ved mindre indgreb får barnet også ofte lagt en lokalbedøvelse efter det er faldet i søvn. Det virker som regel i nogle timer efter operationen.

Ved lidt større operationer bruger vi ofte en smertepumpe, som er forbundet til barnets drop. Den kan give en afmålt konstant mængde medicin ind i blodåren, samtidig med at barnet selv kan trykke på pumpen, når det gør ondt.

For mindre børn under 5–6 år er det sygeplejersken, som trykker på pumpen.

Ved større operationer i den nederste del af kroppen får barnet en rygbedøvelse (epidural). Rygbedøvelsen gives via en tynd slange (et kateter), der ligger ind i ryggen. Kateteret bruges til smertebehandling i 1–3 dage efter operationen.

Uanset typen af smertebehandling vil smertebehandlingen blive vurderet af smertesygeplejersken på den daglige smertestuegang. Skal dit barn have en smertepumpe eller en rygbedøvelse får I mere at vide, og anæstesiaafdelingen har også nogle foldere som fortæller mere indgående om smertebehandling i almindelighed, smertepumpen og rygbedøvelse.

HAR DU SPØRGSMÅL?


Hvis der er noget du er i tvivl om vedrørende bedøvelsen, er du velkommen til at henvende dig til en af sygeplejerskerne, som kan formidle kontakt til en læge fra anæstesiaafdelingen.



Udarbejdet december 2004 af:
overlæge Steen Henneberg, lægesekretær Solveig Andersen og kommunikationskoordinator Anja Svejgaard

Børn og bedøvelse

- Information til forældre



INDEN OPERATIONS DAGEN

Dagen før dit barn skal opereres, vil en læge fra anæstesiaafdelingen se til barnet og tale med jer om bedøvelsen. Af hensyn til barnets sikkerhed under operationen vil lægen spørge om en række ting; f.eks. om barnet har været bedøvet før, eventuel overfølsomhed, allergi eller kroniske sygdomme – f.eks. astma eller bronkitis, om barnet er i behandling med medicin, om barnet er forkølet eller har løse mælketænder.

FASTE

Barnet skal faste inden operationen. Når man bliver bedøvet afslappes alle muskler, og hvis ikke mavesækken er tom, risikerer man, at maveindhold løber tilbage gennem spiserøret og ned i lungerne.

Det er derfor vigtigt at overholde fastereglerne af hensyn til barnets sikkerhed.

Fasteregler for børn der skal opereres:

- Indtil kl. 02.00 om natten inden operationen må barnet spise som til hverdag.
- Efter kl. 02.00 skal barnet faste, dvs. at barnet ikke må få mælkeprodukter, mad eller slik.
- Indtil til 2 timer før bedøvelsen må barnet gerne få vand, saft, vand, sukkervand eller æblemost.
- De sidste to timer inden operationen må barnet hverken få mad eller drikke.
- Ammebørn må få bryst indtil 4 timer før bedøvelsen.

BEROLIGENDE MEDICIN

I mange tilfælde giver vi barnet beroligende medicin ½-1 time inden bedøvelsen. Herefter skal barnet blive i sengen. Når barnet skal til operationsgangen, bliver barnet ledsaget af en sygeplejerske fra sengeafdelingen og portøren, der kører sengen.

FORÆLDRENS ROLLE

Mange forældre er forståeligt nok nervøse, når deres barn skal bedøves. Men børnene tåler som regel bedøvelsen godt og er oftest hurtigt friske bagefter. Afdelingen bedøver mange børn og vi har derfor en stor viden om og rutine i bedøvelse af børn.

Vi vil gerne opfordre til, at en eller begge forældre følger med til operationsgangen og er tilstede, når barnet bedøves. Forældre skal have overtrækskittel, operationshue og træsko på af hensyn til hygiejnen på operationsstuen.

Forældres tilstedeværelse er på ingen måde et krav, og hvis du af den ene eller den anden grund har det svært med at være tilstede, skal du bare sige det til personalet.

BEDØVELSEN

Inden barnet køres ind på operationsstuen, vil anæstesipersonalet kontrollere navn, fødselsdag og hvilken operation, der er planlagt. De gentagne spørgsmål kan måske virke lidt irriterende, men de er nødvendige af sikkerhedsgrunde.

Bedøvelsen kan indledes på flere måder. Alle børn får en lokalbedøvende creme påsmurt begge håndrygge. Herefter kan man næsten smertefrit lægge et drop i hånden og indsprøjte et sovemiddel via droppet. Ved denne form for indledning vil barnet falde i søvn efter få sekunder.

Bedøvelsen kan også indledes ved, at barnet inhalerer sovemidlet via en maske, hvorved barnet vil sove efter 1-2 minutter.

Mindre børn kan i stedet få et sovemiddel som en stikpille. På denne måde tager det noget længere tid (6-8 minutter) inden søvnen indfinder sig.

Når barnet er faldet i søvn, skal du forlade operationsstuen og gå tilbage til sengeafdelingen. Her vil du få besked, når operationen er overstået. Du vil så kunne være til stede hos dit barn, mens det vågner på opvågningsstuen. Når barnet er tilstrækkeligt vågent - sædvanligvis efter 1-1½ time - vil barnet blive kørt tilbage til sengeafdelingen.