

Kroniske smerter, smertebehandling til nyresyge QUIZ

Den sederende bivirkning ved opstart af Fentanyl – plaster viser sig efter ca ?

- ☐ 6 timer
- ☐ 8 timer
- ☐ 17 timer
- ☐ 26 timer

En opioid tilvænnet patient, som får sin vanlige smertestillende medicin i operationsdøgnet?

- ☐ Kræver alligevel større doser opioid end den ikke opioidtilvænnede patient
- ☐ ER lettere at smertelindre postoperativt, end hvis vedkommende ikke får sin vanlige smertestillende medicin
- ☐ Skal ofte have narcanti i afslutningen af en generel anæstesi for at genvinde bevidsthed
- ☐ Kræver samme doser opioid i opvågningsforløbet, som en hvilken som helst anden patient ?

En PN dosis bør altid være?

- ☐ Inj morfin 0,1 mg/kg hver 4-6 time
- ☐ ¼ af samlet dørndosis
- ☐ 1/6 af samlet døgndosis
- ☐ Kaps Oxynorm

En nedtrapningsplan skal tilrettelægges således at

Patienten ikke har mulighed for at ændre på datoen for næste reduktion af dosis

- ☐ ja ☐ nej

Patienten er informeret om at han har mulighed for at stoppe behandlingen brat hvis han føler at han ikke har behov for medicin

- ☐ ja ☐ nej

Hvor mange gange i døgnet skal man som minimum smertevurdere patienten?

- ☐ 1 gang i hver vagt
- ☐ 1 gang i døgnet
- ☐ 3 gange i hver vagt

Patienten har ondt og responderer ikke som forventet på PN smertebehandling og ønsker mere, hvad gør du først?

- ☐ Notere i journalen at patienten er plæderende og ikke få IV
- ☐ Patienten har forventning om smertefrihed informeres at der vil være smerter efter operation
- ☐ Patienten skal have justeret sin smertebehandling og PN dosis

Kroniske smerter, smertebehandling til nyresyge QUIZ

Man har kroniske smerter per definition efter ?

- ☐ 6 uger
- ☐ 3 måneder
- ☐ 6 mdr
- ☐ 1 år

Hvad må man give patienter med nyrefunktion – GFR 50-80?

- ☐ Gabapentin
- ☐ Metadon
- ☐ NSAID
- ☐ Tramadol
- ☐ Morfin
- ☐ Depotpræperater

Hvorfor er ketogan ikke anbefalet til patienter med nedsat nyrefunktion mere?

- ☐ Farmakokinektik, manglende viden og stor risiko for at udvikling af misbrug
- ☐ Det er for dyrt
- ☐ Det påvirker nyrefunktionen

Toleranceudvikling er

- ☐ Når patienten udvikler en høj smertetærskel
- ☐ Når patienten får mindre effekt ud af samme dosis opioid
- ☐ Når patienten er blevet hospitaliseret

Kroniske smerter, smertebehandling til nyresyge QUIZ

Den sederende bivirkning ved opstart af Fentanyl – plaster viser sig efter ca ?

- ☐ 6 timer
- ✓ ☒ 8 timer
- ☐ 17 timer
- ☐ 26 timer

En opioid tilvænnet patient, som får sin vanlige smertestillende medicin i operationsdøgnet?

- ✓ ☒ Kræver alligevel større doser opioid end den ikke opioidtilvænnede patient
- ☐ ER lettere at smertelindre postoperativt, end hvis vedkommende ikke får sin vanlige smertestillende medicin
- ☐ Skal ofte have narcanti i afslutningen af en generel anæstesi for at genvinde bevidsthed
- ☐ Kræver samme doser opioid i opvågningsforløbet, som en hvilken som helst anden patient ?

En PN dosis bør altid være?

- ☐ Inj morfin 0,1 mg/kg hver 4-6 time
- ☐ ¼ af samlet dørndosis
- ✓ ☒ 1/6 af samlet døgndosis
- ☐ Kaps Oxynorm

En nedtrapningsplan skal tilrettelægges således at

Patienten ikke har mulighed for at ændre på datoen for næste reduktion af dosis

- ✓ ☒ ja
- ☐ nej

Patienten er informeret om at han har mulighed for at stoppe behandlingen brat hvis han føler at han ikke har behov for medicin

- ✓ ☒ ja
- ☐ nej

Hvor mange gange i døgnet skal man som minimum smertevurdere patienten?

- ✓ ☒ 1 gang i hver vagt
- ☐ 1 gang i døgnet
- ☐ 3 gange i hver vagt

Patienten har ondt og responderer ikke som forventet på PN smertebehandling og ønsker mere, hvad gør du først?

- ☐ Notere i journalen at patienten er plæderende og ikke få IV
- ☐ Patienten har forventning om smertefrihed informeres at der vil være smerter efter operation
- ✓ ☒ Patienten skal have justeret sin smertebehandling og PN dosis



Kroniske smerter, smertebehandling til nyresyge QUIZ

Man har kroniske smerter per definition efter ?

- ☐ 6 uger
- ✓ 3 måneder
- ☐ 6 mdr
- ☐ 1 år

Hvad må man give patienter med nyrefunktion – GFR 50-80?

- ✓ Gabapentin
- ☐ Metadon
- ☐ NSAID
- ☐ Tramadol
- ☐ Morfin
- ☐ Depotpræperater

Hvorfor er ketogan ikke anbefalet til patienter med nedsat nyrefunktion mere?

- ✓ Farmakokinektik, manglende viden og stor risiko for at udvikling af misbrug
- ☐ Det er for dyrt
- ☐ Det påvirker nyrefunktionen

Toleranceudvikling er

- ☐ Når patienten udvikler en høj smertetærskel
- ✓ Når patienten får mindre effekt ud af samme dosis opioid
- ☐ Når patienten er blevet hospitaliseret

