

**Tør AMD med geografisk atrofi:
Hvem kan deltage i PARASOL-studiet?**

RIGSHOSPITALET AFDELING FOR ØJENSYGDOMME

VIGTIGSTE KRITERIER FOR DELTAGELSE

AMD med geografisk atrofi i mindst et øje og begge øjne uden karnydannelse

Kandidatøje med Snellenvisus 6/60 eller bedre

Naboøje med fingertælling eller bedre

Godt indblik til fundus

60 år eller ældre

Geografisk atrofi dækkende 1-7 papilarealer, heraf mindst et område $> \frac{1}{2}$ papilareal

Geografisk atrofi ikke nået til foveas centrum



Geografisk atrofi ikke sammenflydende med peripapillær atrofi

Geografisk atrofi ikke uden for karbuerne



Hyperautofluorescens i randen af atrofien (se næste side)

Fundusautofluorescens
(forventes udført på Rigshospitalet)


BRUGBAR




IKKE BRUGBAR




Kan OCT erstatte autofluorescensfotografering?




Fortykket eller eleveret
RPE er forbundet med
forhøjet randfluorescens
Derfor er øjet
sandsynligvis brugbart



≈



Har atrofi nået centrum af fovea?



Hvis atrofi, som på billedet til venstre, har nået foveas centrum, er øjet ikke brugbart

HENVISNING: Jeannette Heintze, 3863 4446, jewehe01@regionh.dk

RÅDSLAGNING: Michael Larsen, 2476 1188, miclar01@regionh.dk