

Symptomer efter **kræft i kønslæberne**

Når man har været behandlet for kræft i kønslæberne kan man blive usikker på de mindste symptomer. Det kan være svært at skelne mellem tegn på at tumoren er vendt tilbage, følger af behandlingen og ufarlige hverdags skavanker.

Du skal kontakte en læge hvis du umiddelbart efter operationen oplever

- Hævelse i lysken med rødme og varme – det kan skyldes infektion
- Såret går op - det skal vurderes af en læge og derefter hele langsomt op fra bunden

Ufarlige men generende følgevirkninger til behandlingen kan være

- Følelsesløshed omkring kønslæberne
- Problemer med at genoptage samliv pga. snæver skede
- Manglende orgasme pga. fjernet klitoris
- Skæv stråle ved vandladning

En anden følgevirkning kan være **lymfødem**:

- Lymfødem viser sig ved hævelse af benene og lysken. Der findes behandlingsmuligheder som helst skal påbegyndes med det samme, derfor er det vigtigt at diskutere dette med din læge ved næste kontrolbesøg og eventuelt rykke kontrolbesøget frem.

Nedenfor beskrives fysiske symptomer der kan være tegn på at kræften er vendt tilbage, og som det er vigtigt at du reagerer på hvis de vedvarer og påvirker din hverdag.

Du kan selv holde øje med symptomer som

- Et nyopstået sår der ikke vil hele og måske bløder
- En nyopstået knude på kønslæberne
- Lokaliseret kløe kan være tegn på celleforandringer, som er et forstadium til kræft på kønslæberne
- Hævelse eller knude i lysken
- Smerter

Hvis du får nogle af de nævnte symptomer er du meget velkommen til at ringe til sygeplejetelefonen i Gynækologisk Ambulatorium og få fremskyndet dit kontrolbesøg på telefon 35 45 81 81 mellem kl. 14.30 og 15.45.