

Symptomer efter livmoderhalskræft behandlet med keglesnit

Når man har været behandlet for livmoderhalskræft med keglesnit, er det fordi man har haft et meget tidligt stadie af livmoderhalskræft som ofte er opdaget ved en tilfældighed, fordi livmoderhalskræft i tidlige stadier sjældent giver symptomer. Så længe du har din livmoder må det derfor anbefales at du årligt får foretaget celleprøver.

Nedenfor beskrives fysiske symptomer der kan være tegn på at kræften er vendt tilbage, og som det er vigtigt at du reagerer på hvis de vedvarer og påvirker din hverdag.

Du kan selv holde øje med:

- Blødning mellem menstruationerne og ved samleje

Symptomer du formentligt ikke vil opleve, men som det er vigtigt at reagere på:

- Smerter i nederste del af maven som måske trækker om i lænd/ryg
- Ændret udflåd fra skeden
- Nyopstået træthed

Vaccine

En medvirkende årsag til at man udvikler livmoderhalskræft er, at ens krop ikke har været i stand til at komme af med en infektion (betændelse) med Human Papilloma Virus (HPV). Der findes en vaccine mod HPV virus, og vi formoder, at denne vaccine kan nedsætte risikoen for at du atter får kræft og /eller celleforandringer i livmoderhalsen. Derfor anbefaler vi at du får denne vaccine. Desværre er det en vaccine du selv skal betale og som du får hos din egen læge.

Man kan på celleprøven teste for HPV virus. Hvis du fortsat får konstateret højrisiko HPV ved celleprøven er det en god ide at få fjernet livmoderen når du har fået de børn du ønsker.

Kontakt

Hvis du får nogle af de nævnte symptomer er du meget velkommen til at ringe til sygeplejetelefonen i Gynækologisk Ambulatorium og få fremskyndet dit kontrolbesøg på telefon 35 45 81 81 mellem kl. 14.30 og 15.45.