

	Patient til FORSKNINGSPROJEKT?				
	Inklusion	Projektets spørgsmål	Eksklusion	Tidsfrist for inklusion	Kontakt
Tidlig diagnose af cerebral parese	<ul style="list-style-type: none"> <li>Børn vurderet hjerneskadet ud fra ultralyds-scanning eller MRI</li> <li>efter behandling med hypotermi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan musklernes udvikling forudsige cerebral parese hos børn med tegn på hjerneskade?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fødselsvægt:&lt;700g</li> <li>Genetisk diagnose</li> <li>Alvorlig hjerneskade</li> <li>Alvorlig hjertesygdom</li> <li>Metabolisk sygdom</li> </ul>	November 2019 +tdx	Maria Willerslev-Olsen 22834005 <a href="mailto:mwo@elsasscenter.dk">mwo@elsasscenter.dk</a>  Ane L.,Gorm
Parashute	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstart af i.v. eller p.o. paracetamol</li> <li>Uanset GAog op til PMA 44 fulde uger ved inklusion</li> <li>Ved p.o. paracetamol skal en af de følgende indikationer være tilstede:</li> <li>1. Pleuradræn, "</li> <li>2.Postoperative smerter,</li> <li>3. Cephalhæmatom,</li> <li>4.Frakturer, 5. smertefulde hudlæsioner hos præmature.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvor hurtigt omsættes Paracetamol hos nyfødte børn?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allergi overfor paracetamol</li> <li>Hvis den ansvarlige læge finder patienten uegnet til at deltage</li> </ul>	Inden første dosis paracetamol gives (kan udskydes op til 18 timer efter opstart hvis der er taget ALAT og bili inden).	Sissel Haslund-Krog Tlf. 20653555 Madeleine Vesth/Susanne Poulsen i afdelingen
Præmaturitetsretinopati (ROP) hos for tidlig fødte børn med en diabetes-lignende nethinde sygdom	<ul style="list-style-type: none"> <li>GA &lt; 32 uger</li> <li>Hvis inkl. På HGH, NOH eller HVH og overflyttes til RH, fortsættes blodprøvetagningen på RH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er der sammenhæng mellem højt blodsukker og øjensygdommen ROP?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>	Indenfor 14 dage (-/+4)	Carina Slidsborg, øjenlæge 21910088
CPH Baby Skin*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Præmature indlagt på GN</li> <li>Begge forældre med kaukasisk hudtype</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er der egenskaber ved spædbørns hud som kan forudsige børneeksem?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alvorlige medfødte misdannelser</li> </ul>	Ingen	Maria Rasmussen Rinnov, Læge, ph.d. –stud.
FortiColos	<ul style="list-style-type: none"> <li>GA : 26 + 0 - 30 + 6</li> <li>Stamsygehus enten Herlev, Hvidovre eller RH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er ko-kolostrum bedre til "forstærkning" af mors mælk end det vi bruger nu?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Børn født med misdannelser eller fødselsskader</li> <li>Børn som har fået foretaget mavetarmopr. forud for forsøget</li> </ul>	Senest ved 140 ml/kg/døgn enteral ernæring	Lise Aunsholt Susanne søndergaard Kappel 20 82 23 78
Tarm-perfusions-projekt (NEC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>NEC</li> <li>Malrotation</li> <li>Volvulus</li> <li>Abdominalt kompartmentsyndrom</li> <li>Invagination</li> <li>&lt; 5 år</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan billeder af blodgennemstrømningen i tarmen hjælpe kirurgen under operationen?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manglende samtykke</li> <li>Hvis forældremyndighedsindehaverne ikke kan forstå indholdet af samtykke</li> </ul>		Kristine Bach Korsholm Knudsen Tlf. 2893 3904  Rune tlf. 2245 1331  Jonas tlf. 6017 8702
FAST	<ul style="list-style-type: none"> <li>Børn &lt; 36+0</li> <li>Som får anlagt NG sonde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan analyse af væske i mavesækken ved fødslen forudsige om der bliver behov for behandling med surfaktant?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>surfactantbehandling</li> </ul>	Ventrikel sekret skal opsamles og sættes i køleskab mærket med GA <b>før</b> 45 min.	Christian, 22174087
Skift fra iv til po ab, hos mature nyfødte i beh. for tidl. indsættende infektion	<ul style="list-style-type: none"> <li>GA ≥ 37+0</li> <li>Barnet er skiftet fra intravenøs til per oral antibiotisk behandling med amoxicillin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan dosis af peroral Amoxicillin nedsættes?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Inkluderes før crp kontrol som typisk sker 48 timer efter skift til peroral antibiotika.	Læge Emma Malchau Carlsen  Mail: <a href="mailto:emma.louise.malchau.carlsen@regionh.dk">emma.louise.malchau.carlsen@regionh.dk</a>  Mobil: 27380508
Undersøgelse af bakteriel RNA signatur i blod hos nyfødte med sepsis	<ul style="list-style-type: none"> <li>GA ≥ 37+0</li> <li>Positiv bloddyrkning og/eller crp &gt; 100 mg/ml</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan RNA signatur detektere bakterier i blodet hos nyfødte børn?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Inkluderes senest 48 timer efter antibiotisk behandling opstart, senest 24 timer efter positivt bloddyrknings svar.	Læge Emma Malchau Carlsen  Mail: <a href="mailto:emma.louise.malchau.carlsen@regionh.dk">emma.louise.malchau.carlsen@regionh.dk</a>  Mobil: 27380508