Decitabine vedligeholdelse

NAVN: Godkendt _____

CPR: Højde_____ Vægt_____ BSA_____

År: Dato:																									
Uge		1					2	3	4	1					2	3	4	1					2	3	4
Kur nummer		6								7								8							
Behandlingsdag nr i cyklus:	0	1	2	3	4	5				1	2	3	4	5				1	2	3	4	5			
Decitabine 20 mg/m2 x1 iv over 1 time, d 1-5[1)]		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
gb., leuco, thromb. + diff. beregnet (1-2 gange ugentligt, afhængig af udgangs-punkt)	0									0								0							
CRP	0									0								0							
Faktor 2,7,10, APTT	0									0								0							
ALAT, ASAT, bas. fosfatase, bilirubin, LDH	0									0								0							
Creatinin, Na, Kalium	0									0								0							
B-glucose	0									0								0							

1)

- Gives hver 4. – 6. uge
- Dosis må ikke overstige 20mg/ m^2 per dag eller 100mg/m^2 per kur.
- Behandling fortsættes så længe der ikke er sygdomsprogression
- Hvis hæmatologisk restitution tager mere end 6 uger (neutrocyttal 1,0 eller trombocyttal 50) uden at der er progression, bør næste kur reduceres til 4 dage uændret dosis.
- Hvis hæmatologisk restitution tager mere end 6 uger igen i den efterfølgende kur kan dosis reduceres yderligere til 3 dage med uændret dosis,
- Ved tvivl om hvorvidt faldende hæmatologiske parametre er forårsaget af toxicitet eller progression må laves knoglemarv, alternativt udsættes behandlingen
- Patienter, der transplanteres kan ikke fortsætte med decitabine posttransplantation
- Decitabine har kun 3 timers holdbarhed på køl. Skal i stuetemp en time før administration.

Kvalmebehandling: Moderat på dage med kemoterapi.
Moderat
I henhold til afdelingsstandard for Decitabine