

Højde Vægt BSA:

* Undlades hvis pt. var i CR efter 1. kur

Bemærkninger	
1) Dosisreduktion	Daunorubicin: Bilirubin 20-50 µmol/l: Reducer dosis med 25% Bilirubin > 50 µmol/l: Reducer dosis med 50% Kreatinin 0,105-0,265 mmol/l: Reducer dosis med 25% Kreatinin > 0,265 mmol/l: Reducer dosis med 50% Cytosinearabinoside: Bilirubin > 34 µmol/l: Reducer dosis med 50%
2) Noxafil	Behandling med noxafil fortsættes til neutrocyttallet > 0,5 x 10 ⁹ /l
Knoglemarv	Der sendes 2-4 ml KM prøver til Birmingham dage 21-28 efter afsluttet kemoterapi for alle patienter, der er MRD pos eller ukendt efter kur 1 (Høj risiko). Skal tages mandag til onsdag, hvis overhovedet muligt. Dagen før en sønehelligdag skal også undgås, da der ikke vil være mulighed for at få prøverne analyseret på en SH dag eller weekend. Hvis prøverne bliver for gamle er der risiko for MRD undersøgelsen ikke kan laves. Hvis marven er hypocellulær, skal den gentages efter yderligere 7 – 10 dage Komplet remission/CR: < 5% myeloblaster i normocellulær knoglemarv, tegn på myeloid regeneration, og inden for 14 dage fra KM skal trombocytter over 100 x10⁹/l og neutrofile over 1.0 x10⁹/l Komplet remission med inkomplett regeneration/CRi: som ovenfor men trombocytter eller neutrofiler opfylder ikke ovenstående. Partiel remission/PR: 5-15% myeloblaster i normocellulær knoglemarv, tegn på myeloid regeneration, trombocytter over 100 x10⁹/l og neutrofile over 1.0 x10⁹/l Resistent sygdom/RD: >= 15% myeloblaster efter 1ste kur. Refraktær sygdom: Opnår ikke CR efter kur 2. Disse patienter fortsætter ikke behandling iht. protokollen, men bliver fulgt for survival resten af deres liv.
Videre behandling	Hvis patienten er i CR efter Kur 2 skal de patienter, der var MRD positiv/ukendt post kur 1 videre til Kur 3 DA 2+5. For de, der var MRD negative post kur 1 skal der randomiseres mellem DA 2+5 og IDAC. I begge tilfælde skal kur 3 først begynde ved tegn på myeloid regeneration med neutrofile over 1 mia/l og trombocytter over 80 mia/l Hvis patienten ikke har opnået CR efter kur 2 udgår patienten af AML18, men følges for survival.
Kvalmebehandling	<u>Moderat kvalmebehandling:</u> Brug standard