

Patientbrochure til mænd

Revlimid



- Revlimid er i familie med et lægemiddel, som hedder Thalidomid. Thalidomid er et stof, som kan forårsage alvorlige, livstruende fosterskader. Hvis Revlimid indtages under graviditet, kan fosterskader ikke udelukkes. Revlimid må ikke anvendes under graviditet.
- Man ved ikke om Revlimid går over i mænds sædevæske. Hvis din kvindelige partner kan blive gravid og ikke benytter en sikker præventionsmetode, skal du anvende kondom under behandlingen og 1 uge efter at behandlingen er afsluttet. Du må ikke donere sæd under behandlingen og 1 uge efter at behandlingen er afsluttet.
- Hvis din partner bliver gravid, mens du er i behandling med Revlimid, skal du omgående informere din læge.
- Din læge vil udfylde et patientkort, som bekræfter, at du har fået de nødvendige oplysninger, som gør sig gældende for dig angående graviditet under behandling med Revlimid.
- Du må aldrig give Revlimid til andre personer.
- Ikke anvendte kapsler skal altid afleveres til ambulatoriet/afdelingen som kan sørge for at apoteket kan destruere dem.
- Den mest almindelige, alvorlige bivirkning under behandling med Revlimid er et nedsat antal hvide blodlegemer, som bekæmper infektion og nedsat antal blodplader, som får blødningen til at standse.
Din læge vil ordinere blodprøver hver uge i mindst de første 8 uger af behandlingen.
Revlimid kan ligeledes forårsage tromboser (blodpropper i årerne).

Du skal omgående fortælle det til din læge, hvis du får:

- feber, kulderystelser, ondt i halsen, hoste, sår i munden eller andre symptomer på infektion
 - blødninger eller blå mærker uden at du er kommet til skade
 - smerter i brystet eller benene
 - bliver forpustet.
- Tal med lægen, hvis du får andre mulige bivirkninger, mens du er i behandling med Revlimid.

