

Gastroskopi

Undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm

Hensigten med denne vejledning er at forklare hvad der foregår ved en gastroskopi. Hvis du ønsker yderligere oplysning, er du altid velkommen til at spørge sygeplejersker og læger.

Hvad er et gastroskop?

Et gastroskop er en bøjelig slange med et kamera i spidsen. Gastroskopet er knapt 1cm. tykt. Der kan gennem gastroskopet tages vævsprøver af slimhinden til undersøgelse under et mikroskop. Nogle sygdomme f. eks. blødning fra et mavesår kan direkte behandles gennem gastroskopet.

Forberedelse til undersøgelsen

Faste

For at kunne vurdere forholdene i mavesækken skal den være tom, du må derfor ikke have spist eller drukket 6 timer før undersøgelsen.


Medicin

Hvis du til daglig får vigtig medicin for eksempel hjertemedicin, vanddrivende medicin eller smertestillende medicin, kan den tages indtil 2 timer før undersøgelsen med et glas vand. Hvis du har sukkersyge og får Insulin, skal du ringe ind til os på tlf. 35 45 23 21 og lave en aftale om, hvordan du skal forholde dig.

Får du sukkersyge-tabletter, skal du ikke tage din tablet om morgenen, men vente til du må spise efter undersøgelsen.

Blodfortyndende behandling

Tager du præparater som Magnyl, Hjertemagnyl, Heparin, smertestillende gigtmedicin eller Persantin, kan du fortsætte som vanligt med medicinen. Er du i behandling med andre blodfortyndende præparater (for eksempel: Marevan, Marcumar, Plavix) skal du en uge før, du skal til undersøgelse / behandling kontakte afdelingen på tlf. 35 45 21 23 og aftale, hvordan du skal forholde dig.



Tænder

Hvis du har fået indsat kroner, stifttænder, broer og lignende, bedes du oplyse om dette. Hvis du har protese, skal denne tages ud før undersøgelsen. Til beskyttelse af dine tænder og for ikke at beskadige gastroskopet, vil du få en tandbeskytter i munden.

Værdigenstande

Du skal ikke medbringe værdigenstande eller større kontante beløb, idet disse ved eventuel bortkomst ikke erstattes af hospitalet.

Ventetid?

I tilfælde af uventede situationer kan der forekomme ventetid, du vil da blive nærmere orienteret af personalet.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du har mulighed for få beroligende medicin, enten fordi du selv ønsker det, eller vi skønner, at det er nødvendigt. Du vil få lagt en kanyle i en blodåre i armen, som medicinen gives igennem. Medicinen bevirker, at du døser under undersøgelsen.

Du vil få målt blodtryk og puls for at holde øje med medicinens virkning. Vi anbefaler, at du bliver lokalbedøvet i halsen med en spray, for at dæmpe reflekserne i svælget.

Under undersøgelsen ligger du på venstre side. Når medicinen virker, vil lægen føre gastroskopet gennem mund, svælg, spiserør og mavesæk ned til tolvfingertarmen. Gennem ultralydsskopet blæses luft ned i maven, for at lægen kan få et bedre overblik over mavesækkens indre. Det kan give anledning til, at det spænder lidt i maven. Du kan også få trang til at bøvs. Luften suges ud igen, inden gastroskopet tages op.

Hvor lang tid varer undersøgelsen?

Undersøgelsen varer sjældent mere end 10 minutter.

Gør det ondt?

Nej. Det kan dog være lidt ubehageligt at få gastroskopet ført ned gennem svælget. Under undersøgelsen kan det spænde noget, fordi der er blæst luft ned i maven. Du vil under undersøgelsen kunne trække vejret helt normalt.

Hvad sker der efter undersøgelsen?

Hvis du har fået lokalbedøvelse i halsen, må du ikke spise eller drikke en time efter undersøgelsen. Det er for at undgå at få maden i "den gale hals". Hvis du ikke har fået beroligende medicin, kan du forlade afdelingen og genoptage dine normale

aktiviteter. Hvis du har fået beroligende medicin, bør du blive i afdelingen og hvile i nogle timer. Medicinen nedsætter din dømmekraft resten af dagen, du må derfor ikke køre bil.

Besked om undersøgelsesresultatet.

Før du forlader afdelingen, vil du få besked om resultatet af undersøgelsen og om eventuelle forholdsregler efter undersøgelsen.

Risiko ved gastroskopi

Ved gastroskopi forekommer der komplikationer i 1 ud af 10000 tilfælde. Det kan være overfølsomhed eller kraftig reaktion overfor den beroligende medicin, hul på spiserør/mavesæk eller blødning fra slimhinden.

Disse komplikationer viser sig ved svære mavesmerter, blodige eller sorte opkastninger eller høj feber. Skulle du få et eller flere af disse symptomer bedes du henvende dig på

Rigshospitalet

Kirurgisk Ambulatorium og Endoskopiafsnit 2123C9

Telefon: 35 45 23 21 (mandag-fredag kl. 9.00-12.00 og kl. 13.00-14.00, torsdage dog kl. 9.30-12 og kl. 13.00-14.00)

Udenfor disse tidspunkter kontaktes vagtlægen

I meget sjældne tilfælde kan der opstå tandskade ved gastroskopi. Skulle du blive opmærksom på noget sådant, må du straks henvende dig til afdelingen for at få nærmere vejledning. Hospitalet kan ikke påtage sig at betale for tandskader, som er behandlet hos private tandlæger.

Med venlig hilsen
Læger og sygeplejersker