

Adenovirus DNA PCR i fæces

Analysen udføres på fæces, opsamlet i sædvanlige fæcesprøverør.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på papirblanket hvor der angives i fri tekst "Adenovirus PCR screening" på blanketten. Fra 1. august 2014 kan analysen rekvireres via Opus.

Prøven sendes til Klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA) RH-afsnit 9301.

Hurtigt svar

Analysen udføres min. én gang om ugen, således at der gives svar efter max. to arbejdsdage efter modtagelse af prøven.

Validering

Analysen er valideret internt på fæcesprøver. Mulighederne for ekstern kvalitetssikring undersøges p.t.

Om Adenovirus

Der findes mere end 60 forskellige adenovirus i 7 undergrupper. Nogle findes i luftvejene, nogle i blodbanen og nogle i tarmkanalen. Hos haplotransplanterede patienter kan adenovirus reaktiveres og give anledning til hepatitis og multiorgansvigt. Det er vist, at det første sted adenovirus kan detekteres er i fæces – og først senere kan det påvises i blodbanen. Ved positivt resultat for adenovirus startes antiviral behandling, der giver patienterne en større chance for at overleve denne infektion.

Intern pris

DKK 1.012